

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ESAME DI ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA PREPARAZIONE PER L'ESAME

Un'adeguata preparazione per l'esplorazione del tratto digestivo superiore risulta indispensabile per migliorare l'accuratezza diagnostica della procedura.

E' assolutamente indispensabile seguire i seguenti suggerimenti:

1- la sera precedente l'esame è opportuno effettuare una cena leggera con:

-50 g. di pasta condita con olio extravergine d'oliva e poco parmigiano

-100 g. di pesce lesso o carne bianca condita con 2 cucchiaini di olio extravergine d'oliva (E.V.O.)

2- digiuno assoluto **7 ore** prima dell'esame.

Sarà possibile assumere solo bevande fredde fino a 2 ore prima dell'esame.

3- il giorno dell'esame è necessario assumere 2 bustine di **Fluimucil mucolitico 600mg** sciolte ciascuna in un bicchiere d'acqua naturale con il seguente schema:

1 bustina 3 ore prima dell'esame

1 bustina 2 ore prima dell'esame.

Durante la preparazione all'esame e anche il giorno stesso, si possono continuare le eventuali terapie in corso

E' indispensabile essere accompagnati perché durante l'esame vengono somministrati farmaci sedativi che controindicano la conduzione di veicoli per 12 ore.

Entro 30 giorni prima della data dell' esame eseguire i seguenti esami :

- EMOCROMO
- ELETTROCARDIOGRAMMA.

Per i pazienti che assumono:

- **Farmaci anti-aggreganti** come ticlopidina (Tiklid, Antigreg e altri), clopidogrel (Plavix) o analoghi dovrebbero essere sospesi 7 giorni prima dell'esame, previa consultazione del proprio medico curante o del cardiologo o dello specialista che li ha prescritti. L'aspirina (Cardioaspirin, Ascriptin o altri) può essere assunta regolarmente.

- **Farmaci anticoagulanti** (Coumadin, Sintrom) dovrebbero essere sospesi 5 giorni prima dell'esame, previa consultazione del proprio medico curante o del cardiologo o dello specialista che li ha prescritti eseguendo dosaggio PT e INR il giorno prima dell'esame, da mostrare al Medico Endoscopista.

I Pazienti portatori di Pace-Maker o di Defibrillatore (ICD) devono effettuare nella settimana che precede l'esame, una valutazione specialistica presso il proprio Centro di Elettrofisiologia. Dopo l'esecuzione dell'esofagogastroduodenoscopia, qualora sia stato utilizzato elettrobisturi, i pazienti verranno inviati al Centro di Elettrofisiologia di riferimento per verificare il funzionamento del dispositivo.

PER QUALUNQUE DUBBIO O PERPLESSITA' RIVOLGERSI AL

DOTTOR TRECCA ANTONELLO
3386905985
atrecca@alice.it